

Kalendari i vaksinimit për fëmijët, adoleshentët dhe të rriturit në Shtetin e Lirë të Saksonisë. (Qendra 01.01.2024)

Vaksina [#]	Postnatal	6 javë	2 muaj	3 muaj	4 muaj	6 muaj	11 muaj	12 muaj (1 vit)	14 muaj	23 muaj	4 vite	5 vite	9 vite	10 vite	25 vite	≥ 50 vite	≥ 60 vite	çdo 10 vjet		
Hepatiti B dhe Hepatiti A (HBV/HAV)		HBV 1/HBV 2 (intervali > 4 javë)							HBV 3/4 ose HAV 1 ► HAV 2 (intervali 6–12 muaj) ose HAV/HBV 1 ► HAV/HBV 2 (intervali > 4 javë) ► HAV/HBV 3 (intervali 6–12 muaj)											
Difteria, tetanozi, pertusis *			DTPa 1	DTPa 2	DTPa 3				DTPa 4			DTPa 5		Tdap					Tdap	
Haemophilus influenzae tipi b *			Hib 1	*	Hib 2				Hib 3											
Polio (IPV) * (trivalent)			IPV 1	*	IPV 2				IPV 3					IPV 4					IPV	
Fruithi, shytat, rubeola (MMR)								MMR 1	MMR 2				MMR 3 [†]							
Variçela (VZV)								VZV 1	VZV 2											
Meningokok B									Meningokok (grupi B)											
Meningokok B ACWY/C									Meningokok (grupet ACWY/C)											
Influenca **																				
COVID-19 **																			COVID-19	
Pneumokoku ***									PCV 1 ► PCV 2 (intervali > 2 muaj), PCV 3 (interval > 7 muaj)											Pneumokoku
Rotaviruset					Rotaviruset															
Viruset papilo humane (HPV) ***														≤ 14 v. HPV1 ► HPV 2 ≥ 15 v. HPV1 ► HPV2 ► HPV3						
Herper zoster ***																			RZV 1 ► RZV 2 (intervali > 6 muaj)	

[#] Është thelbësore të vëzhgoni përmbledhjen e karakteristikave të produktit për vaksinat përkatëse dhe tabelat e mëposhtme me informacion mbi intervalet e aplikimit dhe vaksinimit! ^{*} Të gjithë personat e prëshëm (shih tabelat më poshtë). ^{*} Për kombinimet e antigenit që përmbajnë një komponent pertusis, nevojiten tre injeksione në foshnjëri; Në foshnjat me afat të plotë, vaksinimi i dytë i planifikuar në moshën 3 muajsh mund të anashkalohet kur përdoren vakcina 6 ose 5-fish (të ashtuquajturat orare 2 + 1). ^{**} Përforcues vjetor sezonal me një vaksinë të përshtatur për variantet e virusit qarkullues (COVID-19) ose shtamin (influenca). ^{***} Si preferencë rekomandohen vaksinat e mëposhtme: pneumokoku (nga moshë 18 vjeç): vakcina e konjuguar 20 valente (PCV20), HPV: Vakcina 9-valente; herper zoster: vaksinë rekombinante, ndihmëse (RZV).