

# Calendário de vacinação SIKO\* para crianças, adolescentes e adultos no Estado Livre da Saxónia



Português | Portugiesisch

Vacina	Nascimento	7. Sem. <sup>1</sup>	3. Mês <sup>1</sup>	4. Mês <sup>1</sup>	5. Mês <sup>1</sup>	6. Mês <sup>1</sup>	12. Mês <sup>1</sup>	13. Mês <sup>1</sup>	15. Mês <sup>1</sup>	24. Mês <sup>1</sup>	5. anos de idade <sup>1</sup>	6. anos de idade <sup>1</sup>	10. anos de idade <sup>1</sup>	11. anos de idade <sup>1</sup>	18. anos de idade <sup>1</sup>	26. anos de idade <sup>1</sup>	a cada 10 anos	mais de 50 anos	mais de 60 anos	
Hepatite B <sup>3,6</sup> e Hepatite A <sup>6</sup> (HBV/HAV)			HBV 1/HBV 2 <sup>3</sup>					HBV 3/4 <sup>3</sup> ou HAV/HBV <sup>6</sup>		HAV/HBV <sup>6</sup>										
Difteria, tétano, tosse convulsa <sup>2,3,4</sup>			1. DTPa	2.ª DTPa	3. DTPa			4. DTPa				5. DTPa o. Tdpa <sup>4</sup>		Tdpa				Tdpa		
Haemophilus influenzae Tipo b <sup>4,3</sup>			1. Hib	<sup>3</sup>	2. Hib			3. Hib												
Pólio (IPV) <sup>2,3</sup> (trivalente)			1. IPV	<sup>3</sup>	2. IPV			3. IPV						4. IPV				IPV		
Sarampo, papeira, rubéola (VASPR) <sup>13</sup>							1. VASPR	2. VASPR					3. VAS-PR <sup>13</sup>							
Varicela (VAV) <sup>5</sup>							1.VAV	2.VAV												
Meningocócica B <sup>12</sup>			Meningocócica (grupo B)																	
Meningocócica ACWY <sup>7</sup>			Meningocócica (grupo ACWY/C)																	
Influenza <sup>8</sup>														anual <sup>8</sup>						
Pneumococo						Pneumococo <sup>9</sup>												Pneumococo		
Rotavírus <sup>10</sup>			Rotavírus																	
Papilomavírus humano (HPV) <sup>11</sup>														HPV						
Herpes zóster																				Herpes zóster

\* SIKO = Sächsische Impfkommision (Comissão Saxónica de Vacinação)

Versão: 09/2022

- Definições temporais: Significa, p. ex.: 3.º mês = a partir do 3.º mês = conclusão do 2.º mês; 7.ª semana = a partir da 7.ª semana = conclusão da 6.ª semana = 6 anos de idade = a partir dos 5 anos de vida.
- Intervalos entre as vacinas 1 a 3 ou 1 e 2 pelo menos 4 semanas, entre a 3.ª e 4.ª ou 2.ª e 3.ª vacinas para completar a vacinação básica em pelo menos 6 meses.
- Para combinações de antígenos que contêm um componente pertussis, são necessárias 3 vacinações na infância. No caso de bebés nascidos a termo (ou seja, nascidos após a 37ª semana de gestação), a segunda vacinação programada para os 4 meses de idade (aos 3 meses) de acordo com o calendário de vacinação dos 4 meses de idade (aos 3 meses de idade) podem ser omitida se forem utilizadas 6 ou 5 vacinas (observar informação técnica) (esquema de vacinação 2+1 conforme recomendação 2020/2021 da STIKO no Instituto Robert Koch). Tal resulta num intervalo de pelo menos 8 semanas entre as vacinações 1 (3 meses de idade) e 2 (5 meses de idade). O intervalo entre as vacinações 3 e 4 (para um esquema de vacinação 3+1) ou 2 e 3 (para um esquema de vacinação 2+1) é de pelo menos 6 meses.
- A partir dos 6 anos de idade: Observe as informações especializadas sobre as vacinas devido às restrições de idade relativas à redução do conteúdo de toxoides diftéricos.
- Todas as crianças/adolescentes não vacinados com histórico negativo de varicela e todos os adultos suscetíveis com vacinação de recuperação.
- A partir dos 2 anos de idade: Recomenda-se a vacinação combinada HAV/HBV se a imunização primária contra o HBV não tiver sido iniciada na infância; se sim, vacinar contra a hepatite A monovalente.
- No 1.º ano de idade 2 vacinações (ter em atenção as instruções do fabricante), a partir dos 2 anos de idade 1 vacina. Quando administrada na infância, é recomendado um reforço a partir dos 2 anos de idade. As vacinas devem ser realizadas com uma vacina conjugada tetravalente (sorogrupos ACWY) de acordo com a aprovação para a idade.  
Todas as crianças e adolescentes a partir dos 11 anos de idade até aos 18 anos de idade: Reforço ou primeira vacinação com uma vacina conjugada tetravalente (sorogrupos A, C, W, Y).
- A partir dos 6 meses de idade.
- A vacinação padrão é recomendada até aos 24 meses de idade, de acordo com o respetivo esquema de vacinação com vacina conjugada, em crianças após os 24 meses de idade são recomendadas apenas vacinações de indicação.
- Vacinação oral com 2 ou 3 doses (siga as instruções do fabricante), vacinação simultânea, consultar E1, páginas 8 e 14 (nota de rodapé \*\*\*\*\*).
- Todas as meninas e mulheres, todos os meninos e homens preferencialmente com a vacina monovalente; Seguir o esquema de vacinação do fabricante (esquema de 2 ou 3 doses, dependendo da idade de vacinação).
- Esquema de vacinação de acordo com as instruções do fabricante; é possível a vacinação simultânea com a vacina conjugada D, T, Pa, Hib, IPV, HBV, pneumocócica conjugada, MMR, VZV (cada uma monovalente ou em combinação).
- Na primeira vacinação no 1.º ano de idade e na primeira e segunda vacinação até completou o quarto ano de idade.