



Vaccin	Nais- sance	7 sem. ¹	3 m. ¹	4 m. ¹	5 m. ¹	6 m. ¹	12 m. ¹	13 m. ¹	15 m. ¹	24 m. ¹	5 ans ¹	6 ans ¹	10 ans ¹	11 a ns ¹	18 ans ¹	26 ans ¹	tous les 10 ans	plus de 50 ans	plus de 60 ans		
Hépatite B ^{3,6} et hépatite A ⁶ (HBV/HAV)		HBV 1/HBV 2 ³						HBV 3/4 ³ ou HAV/HBV ⁶			HAV/HBV ⁶										
Diphtérie, tétanos, coqueluche ^{2,3,4}		1. DTPa	2. ³ DTPa	3. DTPa				4. DTPa				5. DTPa o. Tdpa ⁴		Tdpa				Tdpa			
Haemophilus influenzae Type b ^{2,3}		1. Hib	3		2. Hib			3. Hib													
Polio (IPV) ^{2,3} (trivalent)		1. IPV	3		2. IPV			3. IPV					4. IPV					IPV			
Rougeole, oreillons, rubéole (ROR) ¹³							1. ROR	2. ROR					3. ROR ¹³								
Varicelle (VZV) ⁵							1.VZV	2.VZV													
Méningocoque B ¹²		Méningocoque (groupe B)																			
Méningocoque ACWY/C ⁷		Méningocoque (groupe ACWY/C)																			
Grippe ⁸														tous les ans ⁹							
Pneumocoques						Pneumocoques ⁹															Pneumocoques
Rotavirus ¹⁰		Rotavirus																			
Papillomavirus humain (HPV) ¹¹														HPV							
Herpès zoster																				Herpès zoster	

* SIKO = Sächsische Impfkommision (Commission des vaccinations de la Saxe)

Version : 09/2022

- Définition des indications de temps : par ex. : 3 mo. = à partir de 3 mois = 2 mois révolus ; 7 sem. = à partir de 7 semaines = 6 semaines révolues ; 6 ans = à partir du 5ème anniversaire.
- Intervalle entre les vaccinations 1 à 3 ou 1 et 2 au minimum 4 semaines, entre la 3e et la 4e ou la 2e et la 3e vaccination pour achever l'immunisation de base au minimum 6 mois.
- Les combinaisons d'antigènes qui contiennent un composant coquelucheux nécessitent 3 injections à un nourrisson. Chez les bébés nés à terme (c. à d. nés après la 37ème semaine de grossesse), la deuxième vaccination préconisée dans le calendrier des vaccinations au 4ème mois (à l'âge de 3 mois) peut être ignorée (programme de vaccination 2+1 selon les recommandations 2020/2021 STIKO du RKI) si des vaccins 6-en-1 ou 5-en-1 ont été utilisés (respecter les informations spécialisées). Il en résulte un intervalle d'au moins 8 semaines entre les vaccinations 1 (au 3ème mois) et 2 (5ème mois). L'intervalle entre les vaccinations 3 et 4 (programme de vaccination 3+1) ou les vaccinations 2 et 3 (programme de vaccination 2+1) doit être au minimum de 6 mois.
- À partir de l'âge de 6 ans observer les informations spécialisées sur les vaccins en matière de limite d'âge par rapport à une teneur réduite en di-oxydes.
- Tous les enfants / adolescents non vaccinés avec des anticorps négatifs de varicelle et tous les adultes réceptifs en rappel de vaccin.
- À partir de l'âge de 2 ans la vaccination combinée contre l'hépatite A et l'hépatite B est recommandée si l'immunisation de base contre le HBV n'a pas été initiée dès le premier âge (nourrisson) ; si c'est le cas, vacciner contre l'hépatite A de manière monovalente.
- Dans la 1ère année, deux injections (observer les instructions du fabricant), à partir de l'âge de 2 ans 1 injection. En cas de vaccination d'un nourrisson, un rappel est recommandé à partir de l'âge de 2 ans. La vaccination doit être effectuée avec un vaccin conjugué tétravalent (sérogroupes ACWY) selon l'âge autorisé.
Tous les enfants et adolescents entre 11 ans et 18 ans révolus : rappel de vaccination ou première injection avec un vaccin conjugué tétravalent (sérogroupes A, C, W, Y).
- À partir de 6 mois révolus.
- La vaccination standard est recommandée jusqu'à l'âge de 24 mois, selon le programme d'immunisation correspondant avec vaccin conjugué, chez les enfants après 24 mois, seules les vaccinations indiquées sont recommandées.
- Vaccination orale en 2 ou 3 doses (observer les instructions du fabricant), administration simultanée de vaccins voir E1, pages 8 et 14 (note de bas de page****).
- Toutes les filles et les femmes, tous les garçons et les hommes, de préférence avec un vaccin 9-valent ; observer les programmes de vaccination des fabricants (programme de vaccination à 2 ou 3 doses, selon l'âge de vaccination).
- Programme de vaccination selon les instructions du fabricant ; administration simultanée de vaccins avec D, T, Pa, Hib, VPI, VHB, vaccin conjugué antipneumococcique, ROR, VZV (monovalent ou en combinaison) possible.
- En cas de primovaccination jusqu'au 1er anniversaire ainsi que lors de la primovaccination et de la deuxième vaccination jusqu'au 4ème anniversaire.