

Calendario vaccinale (vaccinazioni standard) per lattanti, bambini, ragazzi e adulti¹

Italiano



Età in	Settimane				Mesi							Anni									
	6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	dai 18 anni	dai 60 anni			
Vaccinazione	U4				U5			U6				U7		U7a/U8	U9	U10	U11/J1		J2		
Rotavirus	G1 ^a		G2	(G3)																	
Tetano ^b		G1		G2		G3 ^a						A1		A2			A'				
Difterite ^b		G1		G2		G3 ^a						A1		A2			A'				
Pertosse ^b		G1		G2		G3 ^a						A1		A2			A3'				
Hibb – H. influenzae di tipo b		G1		G2		G3 ^a															
Poliomielite ^b		G1		G2		G3 ^a								A1							
Epatite B ^b		G1		G2		G3 ^a															
Pneumococco ^b		G1		G2		G3 ^a														S	
Meningococco B ^c		G1		G2			G3 ^a														
Meningococco C							G1														
Morbillo						G1			G2											S ^e	
Morbillo, rosolia						G1			G2												
Varicella						G1			G2												
HPV – Papilloma virus umani														G1 ^a	G2 ^a						
Herpes zoster																				G1 ^a G2 ^a	
Influenza																					S (annuale) ^a
COVID-19																					G1 ^a , G2 ^a , G3 ^a S (annuale) ^a

NUOVO

NUOVO

■ Momento di vaccinazione consigliato

■ Periodo di recupero dell'immunizzazione basilare o prima immunizzazione di tutti i soggetti non ancora vaccinati o del completamento di una serie di vaccinazioni incomplete

Legenda

G Immunizzazione basilare (fino a 3 vaccinazioni parziali G1-G3)

A Vaccinazione di richiamo

S Vaccinazione standard

1. RKI 2024. Epid Bull 2024;4:1-72.

a Prima dose di vaccino già all'età di 6 settimane; in base al vaccino impiegato, 2 o 3 dosi a intervalli di almeno 4 settimane.

b Neonati prematuri; ulteriori dose di vaccino all'età di 3 mesi, ossia 4 dosi di vaccino complessive;

c Secondo le informazioni tecniche, la serie di vaccinazioni è composta da 3 dosi di vaccino dall'età di 2-23 mesi e 2 dosi di vaccino dall'età di 24 mesi

d Intervallo minimo dalla dose precedente: 6 mesi.

e Due dosi di vaccino a distanza di almeno 5 mesi; in caso di vaccinazione di recupero in età ≥ 15 anni o in caso di intervallo inferiore a 5 mesi, tra la 1a e la 2a dose è necessaria una 3a dose.

f Richiamo dell'antitetanica ogni 10 anni. Vaccinazione antitetanica successiva una tantum Tdap o, su indicazione, vaccino combinato Tdap-IPV.

g Vaccinazione unica con vaccino MMR per tutti i nati dopo il 1970 ≥ 18 anni con stato di vaccinazione incerto, non vaccinati o solo con vaccinazione infantile

h Vaccinazione fino al raggiungimento del numero di ≥ 3 contatti antigenici SARS-CoV-2 necessari per l'immunità di base (di cui almeno 1 vaccinazione). Intervallo vaccinale minimo tra G1 e G2 da ≥ 4 a preferibilmente 12 settimane e tra G2 e G3 ≥ 6 mesi

i Vaccinazione con PCV20

j Doppia vaccinazione con vaccino Herpes zoster inattivato adiuvato con un intervallo da minimo 2 a massimo 6 mesi.

k Vaccinazione annuale in autunno

* Le vaccinazioni possono essere distribuite su più appuntamenti. I vaccini MMR e V possono essere somministrati lo stesso giorno o con un intervallo di 4 settimane.