



اللقاح	الولادة	7 أسابيع	3 أشهر	4 أشهر	5 أشهر	6 أشهر	11 - 13 شهراً	5 سنوات	6 سنوات	10 سنوات	11 سنة	18 سنة	26 سنة	كل 10 سنوات	فوق 50 سنة	فوق 60 سنة
التهاب الكبد الوبائي ب ³ و ⁶ والتهاب الكبد الوبائي أ ⁶	التهاب الكبد الوبائي ب ³ أو ³ 3/4 أو ³ التهاب الكبد الوبائي أ/التهاب الكبد الوبائي ب ⁶ التهاب الكبد الوبائي أ/التهاب الكبد الوبائي ب ⁶															
الخنق، والتيتانوس، والسعال الديكي ^{2، 3، 4}	الجرعة الأولى ضد الخناق والتيتانوس والسعال الديكي	الجرعة الثانية ضد الخناق والتيتانوس والسعال الديكي ³	الجرعة الأولى ضد الخناق والتيتانوس والسعال الديكي	الجرعة الثانية ضد الخناق والتيتانوس والسعال الديكي	الجرعة الثالثة ضد الخناق والتيتانوس والسعال الديكي	الجرعة الرابعة ضد الخناق والتيتانوس والسعال الديكي	الجرعة الخامسة ضد الخناق والتيتانوس والسعال الديكي	الجرعة السادسة ضد الخناق والتيتانوس والسعال الديكي	الجرعة السابعة ضد الخناق والتيتانوس والسعال الديكي	الجرعة الثامنة ضد الخناق والتيتانوس والسعال الديكي	الجرعة التاسعة ضد الخناق والتيتانوس والسعال الديكي	الجرعة العاشرة ضد الخناق والتيتانوس والسعال الديكي	الجرعة الحادية عشر ضد الخناق والتيتانوس والسعال الديكي	الجرعة الثانية عشر ضد الخناق والتيتانوس والسعال الديكي	الجرعة الثالثة عشر ضد الخناق والتيتانوس والسعال الديكي	الجرعة الرابعة عشر ضد الخناق والتيتانوس والسعال الديكي
المستدمية النزلية النوع ب ^{3، 2}	الجرعة الأولى ضد المستدمية النزلية	3	الجرعة الثانية ضد المستدمية النزلية	3	الجرعة الثالثة ضد المستدمية النزلية	الجرعة الرابعة ضد المستدمية النزلية	الجرعة الخامسة ضد المستدمية النزلية	الجرعة السادسة ضد المستدمية النزلية	الجرعة السابعة ضد المستدمية النزلية	الجرعة الثامنة ضد المستدمية النزلية	الجرعة التاسعة ضد المستدمية النزلية	الجرعة العاشرة ضد المستدمية النزلية	الجرعة الحادية عشر ضد المستدمية النزلية	الجرعة الثانية عشر ضد المستدمية النزلية	الجرعة الثالثة عشر ضد المستدمية النزلية	الجرعة الرابعة عشر ضد المستدمية النزلية
شلل الأطفال ^{2، 3} (ثلاثي التكافؤ)	الجرعة الأولى ضد شلل الأطفال	3	الجرعة الثانية ضد شلل الأطفال	3	الجرعة الثالثة ضد شلل الأطفال	الجرعة الرابعة ضد شلل الأطفال	الجرعة الخامسة ضد شلل الأطفال	الجرعة السادسة ضد شلل الأطفال	الجرعة السابعة ضد شلل الأطفال	الجرعة الثامنة ضد شلل الأطفال	الجرعة التاسعة ضد شلل الأطفال	الجرعة العاشرة ضد شلل الأطفال	الجرعة الحادية عشر ضد شلل الأطفال	الجرعة الثانية عشر ضد شلل الأطفال	الجرعة الثالثة عشر ضد شلل الأطفال	الجرعة الرابعة عشر ضد شلل الأطفال
الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية ¹³	الجرعة الأولى ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية ¹³	الجرعة الثانية ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية ¹³	الجرعة الثالثة ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية ¹³	الجرعة الرابعة ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية ¹³	الجرعة الخامسة ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية ¹³	الجرعة السادسة ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية ¹³	الجرعة السابعة ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية ¹³	الجرعة الثامنة ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية ¹³	الجرعة التاسعة ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية ¹³	الجرعة العاشرة ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية ¹³	الجرعة الحادية عشر ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية ¹³	الجرعة الثانية عشر ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية ¹³	الجرعة الثالثة عشر ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية ¹³	الجرعة الرابعة عشر ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية ¹³	الجرعة الخامسة عشر ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية ¹³	الجرعة السادسة عشر ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية ¹³
جدري الماء ⁵	الجرعة الأولى ضد جدري الماء	الجرعة الثانية ضد جدري الماء	الجرعة الثالثة ضد جدري الماء	الجرعة الرابعة ضد جدري الماء	الجرعة الخامسة ضد جدري الماء	الجرعة السادسة ضد جدري الماء	الجرعة السابعة ضد جدري الماء	الجرعة الثامنة ضد جدري الماء	الجرعة التاسعة ضد جدري الماء	الجرعة العاشرة ضد جدري الماء	الجرعة الحادية عشر ضد جدري الماء	الجرعة الثانية عشر ضد جدري الماء	الجرعة الثالثة عشر ضد جدري الماء	الجرعة الرابعة عشر ضد جدري الماء	الجرعة الخامسة عشر ضد جدري الماء	الجرعة السادسة عشر ضد جدري الماء
المكورات السحائية ب ¹²	المكورات السحائية (مجموعة ب)															
المكورات السحائية ⁷ ACWY/C	المكورات السحائية (مجموعات ACWY/C)															
الإنفلونزا ⁸	سنوياً ⁸															
المكورات الرئوية	المكورات الرئوية ⁹															
الفيروسات العجالية ¹⁰	الفيروسات العجالية															
فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) ¹¹	فيروس الورم الحليمي البشري															
الهربس النطاقي	الهربس النطاقي															

* لجنة اللقاحات الساكسونية، واختصارها (SIKO)

إصدار: 1 يناير/كانون الثاني 2021

- تعريف بيانات السن: ويقصد بها مثلاً: الشهر الثالث = ابتداءً من الشهر الثالث = اكتمال الشهر الثاني؛ الأسبوع السابع = ابتداءً من الأسبوع السابع = اكتمال الأسبوع السادس؛ عمر 6 سنوات = ابتداءً من عيد الميلاد الخامس.
- الفرقات الزمنية بين اللقاحات 1 - 3 أو 1 و 2 و 4 أسابيع على الأقل، وبين اللقاح الثالث والرابع أو الثاني والثالث 6 أشهر على الأقل لإتمام التحصين الأساسي.
- في حال توليفات مودلات المضادات، التي تحتوي على مكونات السعال الديكي، من الضروري حصول الطفل في سن الرضاعة على 3 حُقن طبية في حالة الرُضَع حديثي الولادة بعد انتهاء مدة الحمل كاملة (أي المولودين بعد انتهاء أسبوع الحمل السابع والثلاثين) عند استخدام لقاحات سداسية أو خماسية الأضعاف (الترزم برعاية المعلومات المتخصصة)، يمكن ألا يعطى اللقاح الثاني المفترض حسب الجدول الزمني للقاحات في الشهر الرابع (في عمر 3 أشهر) (نظام اللقاحات 2+1 بما يتماشى مع توصيات 2020/2021 لدى معهد روبرت كوخ). تنتج عن ذلك مسافة زمنية فاصلة قدرها 8 أسابيع على الأقل بين اللقاحين 1 (الشهر الثالث) و 2 (الشهر الخامس). وتبلغ المسافة الزمنية الفاصلة بين اللقاحين 4 (لدى نظام اللقاحات 3+1) أو بين 2 و 3 (لدى نظام اللقاحات 2+1) 6 أشهر على الأقل.
- تُرَاعَى بدءاً من سن 6 سنوات المعلومات المتخصصة عن اللقاحات ذات الصلة بالحد الأدنى للسن فيما يتعلق بتقليل محتوى ثنائي التوكسويد (السم المضعف).
- جميع الأطفال/البالغين غير الحاصلين على اللقاح وليست لديهم سيرة مرضية للإصابة بجدري الماء وجميع البالغين المعرضين للإصابة على اعتبار أنه لقاح لاحق.
- يُنصَح ابتداءً من عمر سنتين بمزيج من اللقاحات ضد التهاب الكبد أ/التهاب الكبد ب، في حال عدم البدء باللقاح الأساسي ضد التهاب الكبد في سن الرضاعة؛ أما في حال البدء باللقاح في سن الرضاعة، فيكفي اللقاح ضد التهاب الكبد أ بلقاح أحادي التكافؤ.
- ننصح، في عمر سنة واحدة، بعدد حقتين طبيئتين (تراعي بيانات الشركة المنتجة)، وننصح بدءاً من عمر سنتين بحقنة واحدة. وفي حال إعطاء اللقاح في سن الرضاعة، ننصح بجرعة منشطة بدءاً من عمر سنتين. ننصح بإعطاء اللقاحات باستخدام لقاح مقترن رباعي التكافؤ (مجموعات المصل ACWY) بحسب المسموح به للمرحلة العمرية. جميع الأطفال والبالغين بدءاً من سن 11 وحتى إتمام سن 18: لقاح مُنشط أو اللقاح الأول باستخدام لقاح مقترن رباعي التكافؤ (مجموعات المصل A، و C، و W، و Y).
- بدءاً من إتمام سن 6 أشهر.
- ننصح باللقاح القياسي حتى سن 24 شهراً بحسب نظام التطعيم المعني وباستخدام لقاح مقترن، وننصح باللقاحات الوقائية فقط للأطفال بعد سن 24 شهراً.
- اللقاح القموي بجرعتين أو 3 جرعات (تراعي بيانات الشركة المنتجة)، اللقاح المتزامن السلبي والنشط، راجع E1، الصفحتين 8 و 14 (الهامش *****).
- يُفضَل استخدام لقاح تساعي التكافؤ على جميع الفتيات والسيدات وجميع البالغين والرجال؛ مع أخذ أنظمة اللقاحات الصادرة عن الشركة المنتجة بالحسبان (نظام الجرعتين أو الثلاث جرعات، بحسب سن اللقاح).
- نظام اللقاح بحسب بيانات الشركة المنتجة؛ اللقاح المتزامن السلبي والنشط باستخدام لقاح الخناق D، التيتانوس T، السعال الديكي Pa، المستدمية النزلية Hib، شلل الأطفال IPV، التهاب الكبد ب HBV، اللقاح المقترن ضد المكورات الرئوية، لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية MMR، لقاح جدري الماء النطاقي VZV (إما أحادي التكافؤ أو بالتوليف)، جميعها ممكنة.
- اللقاح الثاني ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية عند الوصول لسن أربع سنوات، ولا يكون قبل نصف الحَوْل الثامن (سن 46 - 48 شهراً)، وحتى موعد أقصاه/أو حتى سن إجراء الفحوصات الطبية للاتحاق بالمدرسة.