



Vaccino	Nascita	7a sett. ¹	3° mese ¹	4° mese ¹	5° mese ¹	6° mese ¹	12° mese ¹	13° mese ¹	15° mese ¹	24° mese ¹	5° anno di età ¹	6° anno di età ¹	10° anno di età ¹	11° anno di età ¹	18° anno di età ¹	26° anno di età ¹	ogni 10 anni	oltre i 50 anni	oltre i 60 anni
Epatite B ^{3,6} ed epatite A ⁶ (HBV/HAV)			HBV 1/HBV 2 ³					HBV 3/4 ³ o HAV/HBV ⁶		HAV/HBV ⁶									
Difterite, tetano, pertosse ^{2,3,4}			1° DTPa	2° DTPa	3° DTPa			4° DTPa				5° DTPa senza Tdpa ⁴		Tdpa				Tdpa	
Haemophilus influenzae di tipo b ^{2,3}			1° Hib	3°	2° Hib			3° Hib											
Antipolio (IPV) ^{2,3} (trivalente)			1° IPV	3°	2° IPV			3° IPV						4° IPV				IPV	
Morbillo, parotite, rosolia (MPR) ¹³							1° MPR	2° MPR					3° MPR ¹³						
Varicella (VZV) ⁵							1° VZV	2° VZV											
Meningococco B ¹²			Meningococco (gruppo B)																
Meningococco C/ACWY ⁷			Meningococco (gruppi ACWY/C)																
Influenza ⁸																			annuale ⁸
Pneumococco							Pneumococco ⁹											Pneumococco	
Rotavirus ¹⁰			Rotavirus																
Papilloma virus umani (HPV) ¹¹																			HPV
Herpes zoster																			Herpes zoster

* SIKO = Commissione vaccini del Land Sassonia

Versione del 09/2022

- Indicazioni temporali e loro significato: 3° mese = a partire dal 3° mese = 2° mese compiuto; 7° 7a settimana = a partire dalla 7a settimana = 6a settimana compiuta; 6° anno = a partire dal 5° compleanno.
- Intervallo tra le vaccinazioni 1-3 o 1 e 2 almeno 4 settimane, tra la 3a e la 4a o 2a e 3a vaccinazione per il completamento dell'immunizzazione di base almeno 6 mesi.
- In presenza di **combinazioni di antigeni** contenenti una **componente di pertosse** nella primissima infanzia sono necessarie 3 iniezioni. **Per i neonati maturi (ossia nati dopo la 37a settimana di gravidanza), in caso di somministrazione di vaccini esa o pentavalenti (attenersi alle informazioni specifiche) può venir meno la 2a vaccinazione prevista per il 4° mese (all'età di 3 mesi) (schema di vaccinazione 2+1) come da raccomandazioni per il 2020/2021 della Commissione permanente STIKO presso l'istituto RKI). Ne consegue un intervallo di almeno 8 settimane tra la vaccinazione 1 (3° mese di età) e 2 (5° mese di età). L'intervallo tra le vaccinazioni 3 e 4 (con schema di vaccinazione 3+1) o 2 e 3 (con schema di vaccinazione 2+1) deve essere di almeno 6 mesi.**
- A partire dal 6° anno di età osservare le informazioni specifiche sui vaccini relativamente ai limiti d'età con conseguente contenuto ridotto di ditossido.
- I bambini/ragazzi non vaccinati con anamnesi di varicella negativa e tutti gli adulti sensibili come vaccinazione di recupero.
- A partire dal 2° anno di età vaccinazione combinata HAV/HBV consigliata qualora l'immunizzazione di base HBV non sia iniziata nella primissima infanzia; altrimenti vaccino monovalente contro l'epatite A.
- Nel 1° anno di età 2 iniezioni (attenersi alle indicazioni del produttore), a partire dal 2° anno di età 1 iniezione. In caso di vaccinazione nella primissima infanzia è consigliato un richiamo a partire dal 2° anno di età. Le vaccinazioni andrebbero effettuate con un vaccino tetravalente coniugato (sierogruppi ACWY) in base all'età prevista. Tutti i bambini e ragazzi a partire dall'11° anno di età fino al 18° anno compiuto: oppure richiamo o prima vaccinazione con un vaccino tetravalente coniugato (sierogruppi A, C, W, Y).
- Dal 6° mese di età compiuto.
- La vaccinazione standard è consigliata fino al 24° mese di età in base al rispettivo schema di immunizzazione con vaccino coniugato. Per i bambini dal 24° mese di età in su si consigliano solo vaccinazioni su indicazione.
- Vaccinazione per via orale con 2 o 3 dosi (attenersi alle indicazioni del produttore); vaccinazione simultanea vedi E1 pagine 8 e 14 (nota a piè pagina *****).
- Ogni ragazza e donna adulta, ogni ragazzo e maschio adulto preferibilmente con vaccino 9-valente; attenersi alle sequenze di vaccinazione del produttore (schema da 2 o 3 dosi, in funzione dell'età).
- Sequenza di vaccinazione secondo indicazioni del produttore; possibile la vaccinazione simultanea per D, T, Pa, Hib, IPV, HBV, vaccino coniugato anti pneumococchi, MPR, VZV (monovalente o in combinazione).
- In caso di prima vaccinazione nel primo anno di vita e in caso di prima e seconda vaccinazione fino all'età di quattro anni compiuti.