

Ημερολόγιο εμβολιασμού (τυποποιημένοι εμβολιασμοί) για βρέφη, παιδιά, εφήβους και ενήλικες¹

Γερμανικά



Εμβόλιο	Ηλικία σε Εβδομάδες			Μήνες													Ετηχήνια					
	6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	από 18	από 60				
Ροταϊοί	G1 ^a		G2	(G3)																		
Τέτανος ^b	G1		G2		G3 ^c													A1	A2		A'	
Διφθερίτιδα ^b	G1		G2		G3 ^c													A1	A2		A'	
Κοκκύτης ^b	G1		G2		G3 ^c													A1	A2		A3'	
Hib ^b – H. influenzae- Αιμόφιλος της γρίπης τύπου β	G1		G2		G3 ^c																	
Πολιομελίτιδα ^b	G1		G2		G3 ^c													A1				
Ηπατίτιδα Β ^b	G1		G2		G3 ^c																	
Πνευμονιοκόκκοι ^b	G1		G2		G3 ^c																	
NEO2 Μηνιγγιτιδόκκοι Β ^b	G1		G2					G3 ^c														
Μηνιγγιτιδόκκοι C								G1														
Ιλαρά								G1			G2									S ^d		
Παρωτίτιδα, ερυθρά								G1			G2											
Ανεμβολιγία								G1			G2											
HPV – Ιοί των ανθρώπινων θηλωμάτων														G1 ^e G2 ^e								
Έρπης ζωστήρας																	G1 ^f G2 ^f					
Influenza																	S (ετησίως) ^g					
NEO3 COVID-19																	G1 ^h , G2 ^h , G3 ^h S (ετησίως) ^h					

- Συνιστώμενος χρόνος εμβολιασμού
- Χρονικό διάστημα μετέπειτα εμβολιασμού για βασική ή πρώτη αναστοίχιση όλων όσων δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί ή για την ολοκλήρωση μιας ατελούς σειράς εμβολιασμών

Επεξηγήσεις
G Βασική αναστοίχιση (σε έως 3 μερικούς εμβολιασμούς G1-G3)
A Επαναληπτικός εμβολιασμός
S Καθετωμένος εμβολιασμός

¹ RKI 2024. Epidemiol. Inf. 2024;4:1-72.

- Πρώτη δόση εμβολίου από την ηλικία των 6 εβδομάδων, ανάλογα με το εμβόλιο που χρησιμοποιήθηκε, 2 ή 3 δόσεις εμβολίου σε διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων.
- Πρόωρα βρέφη: πρόσθετη δόση εμβολίου σε ηλικία 3 μηνών, δηλαδή, 4 δόσεις εμβολίου συνολικά; τα βρέφη (συμπριελαμβανόμενων των πρώτων ωρών) εμβολιάζονται με PCV13 ή PCV15
- Σύμφωνα με τις τεχνικές πληροφορίες, η σειρά εμβολιασμού αποτελείται από 3 δόσεις εμβολίων από την ηλικία των 2 έως 23 μηνών και από 2 δόσεις εμβολίων από την ηλικία των 24 μηνών.
- Ελάχιστο διάστημα από την προηγούμενη δόση: 6 μήνες.
- Δύο δόσεις εμβολίου με χρονική απόσταση τουλάχιστον 5 μηνών, στον εμβολιασμό που ξεκινά από την ηλικία ≥ 15 ετών ή με χρονική απόσταση εμβολιασμού <5 μηνών μεταξύ της 1ης και της 2ης δόσης απαιτείται μια 3η δόση.
- Αναντισπαστικοί εμβολιασμοί Td (τετάνου - διφθερίτιδας) κάθε 10 χρόνια. Ο επόμενος εμβολιασμός Td (τετάνου - διφθερίτιδας) εράπας ως Tdap (διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη) ή/και αναφέρεται ως συνδυασμός

- εμβολιασμού Tdap-IPV.
- Εράπας εμβολιασμός με εμβόλιο MMR για όλα τα άτομα που γεννήθηκαν μετά το 1970 ≥ 18 ετών με ασφαλή κατάσταση εμβολιασμού, χωρίς εμβολιασμό ή με μόνο έναν εμβολιασμό κατά την παιδική ηλικία.
- Εμβολιασμός μέχρι να επτευχθεί ο αριθμός των ≥ 3 σπορίων αντιγόνου SARS-CoV-2 που απαιτούνται για τη βασική ανοσία (εκ των οποίων τουλάχιστον 1 εμβολιασμός). Ελάχιστο διάστημα εμβολιασμού μεταξύ G1 και G2 ≥ 4 έως κατά προτίμηση 12 εβδομάδες και μεταξύ G2 και G3 ≥ 6 μήνες
- Εμβολιασμός με PCV20
- Εμβολιασμός δύο φορές με το αναστοχασμένο εμβόλιο έρπης ζωστήρας σε διάστημα τουλάχιστον 2 έως το πολύ 6 μηνών.
- Ετήσιος εμβολιασμός το φθινόπωρο
- Οι εμβολιασμοί μπορούν να καταμετρηθούν σε πολλά ραντεβού εμβολιασμού. Τα MMR και V μπορούν να δοθούν κατά το ίδιο ραντεβού ή σε διαστήματα 4 εβδομάδων.

