


Bebekler, çocuklar, gençler ve yetişkinler için aşı takvimi (standart aşılar)¹

Türkçe



Önerilen	Hafta	Ay										Yıl						
	6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	18 ve üzeri	60 ve üzeri
Aşı türü			U4		U5	U6				U7	U7a/U8	U9	U10	U11/J1		J2		
Rota virüsler	G1 ^a		G2	(G3)														
Tetanos ^b (Kazıklı humma)	G1		G2			G3 ^c					A1		A2				A ^e	
Difteri ^b	G1		G2			G3 ^c					A1		A2				A ^e	
Pertusis ^b (Boğmaca)	G1		G2			G3 ^c					A1		A2				A3 ^e	
Hib ^b (<i>H. influenza</i> Tıp b)	G1		G2			G3 ^c												
Poliomyelit ^b (Çocuk felci)	G1		G2			G3 ^c							A1					
Hepatit B ^b	G1		G2			G3 ^c												
Pnömonok ^b	G1		G2			G3 ^c											S ^g	
Meningokok C						G1												
Kızamık						G1				G2						S ⁱ		
Kabakulak, kızamıkçık						G1				G2								
Varisella (Suçiçeği)						G1				G2								
HPV (İnsan papilloma virüsü)													G1 ^d G2 ^d					
Herpes zoster (Zona)																	G1 ^h G ^h	
İnfluenza (Grip)																	S _(yılı)	

■ Aşılama zamanı ■ Henüz hiç aşılanmamış olanların temel veya birincil bağışıklama ya da bitmemiş bir aşılama serisinin tamamlanması için telafi aşılama süresi

Açıklamalar

G Temel bağışıklama (3 doza kadar bölünebilir G1–G3)

A Tazeleme aşısı

S Standart aşı

a İlk aşı dozu 6 haftalık ve üstü bebeklere, kullanılan aşıya göre 2 veya 3 aşı dozu en az 4 haftalık aralıklarla.

b Erken doğanlar: 3 aylık bebeklere ek aşı dozu, yani toplam 4 aşı dozu.

c Bir önceki dozdan sonra beklenmesi gereken minimum süre: 6 ay.

d İkinci aşı dozu arasında en az 5 ay bekleme süresi. 14 yaşından sonra başlayan telafi aşılarında veya iki doz arasındaki süre 5 aydan daha kısa ise 1. ve 2. dozlar arasında 3. bir doz gereklidir.

e Td tazeleme aşısı, 10 yılda bir. Zamanı gelen bir sonraki Td aşısı Tdap veya uygunluğu belirlenmiş Tdap-IPV kombinasyon aşısı şeklinde.

f MMR aşı maddesi içeren tek dozluk aşılama, aşı durumu belirsiz, hiç aşılanmamış ya da çocuklukta sadece bir kez aşılanmış 18 yaş ve üstü 1970 sonrası doğan herkes için.

g 23 valentli polisakkarit bileşenli aşı.

h Adjuvan içeren herpes zoster inaktif bileşenli çift dozlu aşılama, en az 2, en fazla 6 ay aralıklı.

* Aşılamalar birkaç aşı randevusuna bölünebilir. MMR ve V aynı randevuda veya 4 haftalık bir aralıkla yapılabilir.