

Имунизационен календар (стандартни имунизации) за кърмачета, деца, юноши и възрастни¹

Български



Възраст в	седмици			месеци							години								
	6	2	3	4	5–10	11*	12	13–14	15	16–23	2–4	5–6	7–8	9–14	15–16	17	от 18	от 60	
Ваксинация срещу	U4			U5	U6			U7				U7a/U8	U9	U10	U11/J1	J2			
Ротавируси	G1 ^a		G2	(G3)															
Тетанус ^b	G1		G2		G3 ^c							A1	A2			A ^e			
Дифтерия ^b	G1		G2		G3 ^c							A1	A2			A ^e			
Коклюш ^b (магарешка кашлица)	G1		G2		G3 ^c							A1	A2			A3 ^e			
Hib ^b (Хемофилус инфлуенце тип b)	G1		G2		G3 ^c														
Полиомиелит ^b (детски паралич)	G1		G2		G3 ^c							A1							
Хепатит B ^b	G1		G2		G3 ^c														
Пневмококи ^b	G1		G2		G3 ^c										S ^g				
Менингококи C								G1											
Морбили					G1			G2									S ⁱ		
Заушка, рубеола					G1			G2											
Варицела (шарка)					G1			G2											
HPV (Човешки папилома вируси)														G1 ^d G2 ^d					
Херпес Зостер																	G1 ^h G ^h		
Инфлуенца (грип)																	S (всяка година)		

 Препоръчително време за имунизация Период за наваксване с основна или първична имунизация на все още неваксинирани или за завършване на непълна серия от имунизации

Разяснения

G Основна имунизация (на до 3 частични имунизации G1–G3)

A Реимунизация

S Стандартна имунизация

a Първа доза ваксина на възраст 6 седмици, 2 или 3 дози в зависимост от използваната ваксина на интервал поне 4 седмици.

b Недоносени: допълнителна доза ваксина на възраст 3 месеца, т.е. общо 4 дози ваксина.

c Минимален интервал от предходната доза: 6 месеца.

d Две дози ваксина на интервал от поне 5 месеца, при догонваща имунизация, започваща на възраст > 14 години, или на интервал на имунизация <5 месеца, е необходима 3-та доза между 1-ва и 2-ра доза.

e Td реимунизация на всеки 10 години. Следваща Td имунизация веднъж като Tdap или, ако е посочено, като комбинирана имунизация Tdap-IPV.

f Еднократна имунизация с MMR ваксина за всички лица, родени след 1970 г., които са ≥ 18 години с неясен имунизационен статус, без имунизация или само с една имунизация в детска възраст.

g Имунизация с 23-валентната полизахаридна ваксина.

h Двукратна имунизация с адювантна ваксина срещу херпес Зостер на интервал от поне 2 до максимум 6 месеца.

* Имунизациите могат да бъдат разпределени в няколко посещения. MMR и V могат да се правят в едно посещение или на 4-седмични интервали.