



Εμβόλιο	Γέννηση	7η εβδ. ¹	3ος μην. ¹	4ος μην. ¹	5ος μην. ¹	6ος μην. ¹	12ος μην. ¹	13ος μην. ¹	15ος μην. ¹	24ος μην. ¹	5ο έτος ¹	6ο έτος ¹	10ο έτος ¹	11ο έτος ¹	18ο έτος ¹	26ο έτος ¹	κάθε 10 έτη	άνω των 50 ετών	άνω των 60 ετών		
Ηπατίτιδα B ^{3,6} και ηπατίτιδα A ⁶ (HBV/HAV)		HBV 1/HBV 2 ³							HBV 3/4 ³ ή HAV/HBV ⁶		HAV/HBV ⁶										
Διφθερίτιδα, τέτανος, κοκκύτης ^{2,3,4}			1. DTPa	2. ³ DTPa	3. DTPa			4. DTPa				5. DTPa ή Tdpa ⁴		Tdpa			Tdpa				
Haemophilus influenzae τύπου β ^{2,3}			1. Hib	³	2. Hib			3. Hib													
Πολιομυελίτιδα (IPV) ^{2,3} (τριπλό)			1. IPV	³	2. IPV			3. IPV					4. IPV				IPV				
Ιλαρά, παρωτίτιδα, ερυθρά (MMR) ¹³							1. MMR	2. MMR					3. MMR ¹³								
Ανεμοβλογιά (VZV) ⁵							1.VZV	2.VZV													
Μηνηγγιτόκοκκος B ¹²		Μηνηγγιτόκοκκος (Ομάδα B)																			
Μηνηγγιτόκοκκος ACWY/C ⁷		Μηνηγγιτόκοκκος (Ομάδες ACWY/C)																			
Γρίπη ⁸																	ετησίως ⁸				
Πνευμονιόκοκκοι						Πνευμονιόκοκκοι ⁹															Πνευμονιόκοκκοι
Ροταϊοί ¹⁰			Ροταϊοί																		
Ιοί των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) ¹¹													HPV								
Έρπης ζυστήρας																				Έρπης ζυστήρας	

* SIKO = Επιτροπή Εμβολιασμού Σαξονίας

Έκδοση: 09/2022

- 1 Ορισμός χρονικών αναφορών: Σημάνουν π.χ.: 3ος μην. = από τον 3ο μήνα = κλεισμένος 2ος μήνας, 7η εβδομάδα = από την 7η εβδομάδα = κλεισμένη 6η εβδομάδα, 6ο έτος = από τα 5α γενέθλια.
- 2 Αποστάσεις μεταξύ των εμβολιασμών 1–3 ή/και 1 και 2 τουλάχιστον 4 εβδομάδες, μεταξύ του 3ου και 4ου ή/και 2ου και 3ου εμβολιασμού για την ολοκλήρωση της βασικής ανοσοποίησης τουλάχιστον 6 μήνες.
- 3 Για συνδυασμούς αντιγόνων που περιέχουν συστατικό κοκκύτη, απαιτούνται 3 ενέσεις κατά τη βρεφική ηλικία. Σε όψιμα νεογνά (δηλαδή τα οποία γεννήθηκαν μετά την συμπλήρωση των 37 εβδομάδων) δύναται με εφαρμογή 6- ή 5-απλών εμβολίων (λάβετε υπόψη τις ειδικές πληροφορίες) να παραληφθεί ο σύμφωνα με το ημερολόγιο εμβολιασμών αναλογούμενος στον 4ο μήνα ζωής (στην ηλικία των 3 μηνών) 2ος εμβολιασμός (πρόγραμμα εμβολιασμού 2+1 αντίστοιχα προς τις συστάσεις 2020/2021 της ΣΤΙΚΟ στο RKI). Ως εκ τούτου δημιουργείται ένα διάστημα τουλάχιστον 8 εβδομάδων μεταξύ των εμβολιασμών 1 (3ος μήνας ζωής) και 2 (5ος μήνας ζωής). Η απόσταση μεταξύ των εμβολιασμών 3 και 4 (σε πρόγραμμα εμβολιασμού 3+1) ή/και 2 και 3 (σε πρόγραμμα εμβολιασμού 2+1) ανέρχεται σε τουλάχιστον 6 μήνες.
- 4 Από το 6ο έτος να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές πληροφορίες σχετικά με τα εμβόλια λόγω του περιορισμού της ηλικίας σε σχέση με τη μειωμένη περιεκτικότητα σε δι-τοξοειδή.
- 5 Όλα τα μη εμβολιασμένα παιδιά / έφηβοι με αρνητικό ιστορικό ανεμοβλογιάς και όλοι οι επιρρεπείς ενήλικες ως επαναληπτικός εμβολιασμός.
- 6 Από το 2ο έτος συνιστάται συνδυασμός εμβολιασμού HAV / HBV, εάν η αρχική ανοσοποίηση έναντι του HBV δεν ξεκίνησε στην παιδική ηλικία. Αν ναι, τότε εμβολιάστε με μονό εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Α.
- 7 Κατά το 1ο έτος 2 ενέσεις (λάβετε υπόψη τα στοιχεία του κατασκευαστή), από το 2ο έτος 1 ένεση. Κατά τον εμβολιασμό στη βρεφική ηλικία συνιστάται μια ενίσχυση από το 2ο έτος ζωής. Οι εμβολιασμοί θα πρέπει να γίνονται με ένα τετραπλό συζευγμένο εμβόλιο (οροσμάδες ACWY) ανάλογα με την ηλικία.
- 8 Όλα τα παιδιά και οι έφηβοι από το 11ο έτος της ζωής τους έως και κλεισμένο το 18ο έτος ζωής: Ενισχυτικός εμβολιασμός ή πρώτος εμβολιασμός με ένα τετραπλό συζευγμένο εμβόλιο (οροσμάδες A, C, W, Y).
- 9 Από κλεισμένο τον 6ο μήνα ζωής.
- 10 Ο βασικός εμβολιασμός συνιστάται έως τον 24ο μήνα ζωής ανάλογα με το αντίστοιχο πρόγραμμα ανοσοποίησης με συζευγμένο εμβόλιο που συνιστάται, στα παιδιά από τον 24ο μήνα ζωής συνιστώνται μόνο οι ενδεικτικοί εμβολιασμοί.
- 11 Είναι δυνατόν ο δια του στόματος εμβολιασμός με 2 ή 3 δόσεις (λάβετε υπόψη τις οδηγίες του κατασκευαστή), ταυτόχρονος εμβολιασμός βλέπε E1, σελίδες 8 και 14 (Υποσημείωση *****).
- 12 Όλα τα κορίτσια και οι γυναίκες, όλα τα αγόρια και οι άντρες κατά προτίμηση με 9-πλό εμβόλιο. Ακολουθήστε το πρόγραμμα εμβολιασμού του κατασκευαστή (πρόγραμμα 2 ή 3 δόσεων, ανάλογα με την ηλικία εμβολιασμού).
- 13 Πρόγραμμα εμβολιασμού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Επιτρέπεται ταυτόχρονος εμβολιασμός με D, T, Pa, Hib, IPV, HBV, πνευμονιόκοκκο συζευγμένο εμβόλιο, MMR, VZV (έκαστο μονό ή σε συνδυασμό).
- 14 Για τον πρώτο εμβολιασμό κατά το 1ο έτος της ζωής τους καθώς και για τον πρώτο και δεύτερο εμβολιασμό έως και κλεισμένο το 4ο έτος της ζωής τους.